MOUTARDE SINEX - RÉSISTANTE NÉMATODES

UGS : N / A



Moutarde blanche biologique à floraison jaune - Résistante aux NEMATODES

La moutarde blanche nematicide FOX réduit efficacement les populations de nematodes heterodera schachtii et heterodera betae actifs sur betterave sucrière. La moutarde FOX s'implante très rapidement, c'est une variété à floraison tardive ce qui lui permet d'être active sur une longue période.

Floraison fin novembre - Destruction : Gel -5° ou action mécanique.

La moutarde biologique est un **couvert d'été standard de type CIPAN** qui **conserve et améliore la fertilitté du sol et augmente le rendement de la culture suivante**.

Cette culture dérobée biologique a pour principale caractéristique d'**absorber l'azote restant dans le sol après une culture principale**.

La culture de moutarde biologique est gélive, elle ne résiste pas à l'hiver, elle est donc **conseillé pour les inter-cultures d'été.**

Autres conseils

CONSEILS D'IRRIGATION

Afin d'atteindre un rendement optimal, la moutarde bio doit être arrosée jusqu'à la levée.

CONSEILS DE DESTRUCTION

- Détruire la culture de moutarde biologique par labour ou broyage dès l'apparition des premières fleurs
- Si les plantes sont trop grandes et difficiles à enfouir par labour, réaliser un broyage.
- La destruction est facilitée par le gel.
- Il est conseillé d'enfouir la culture de moutarde biologique entre 30 à 50 jours avant la culture suivante, afin d'assimiler au mieux son potentiel de restitution d'azote.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Avantages de la moutarde biologique :

- Très efficace contre les adventices
- Piège correctement le nitrate de la culture précédente
- Excellent restructurant du sol
- Production de masse organique volumineuse
- Augmente le potentiel de rendement de la culture suivante
- Améliore la fertilité du sol

- Implantation facile
- Croissance rapide
- Fleurs mellifères
- Bon précédent pour céréales
- Levée très facile

Inconvénients de la moutarde biologique :

- Non hivernant
- Très sensible au gel
- Faible valeur énergétique
- Floraison tardive
- Peu digestible
- Sensible au stress hydrique et aux températures élevées
- Besoins en azote importants

Conseil de semis

CHOIX DE LA PARCELLE

La moutarde biologique convient à tous types de sols et a une préférence pour les sols basiques (pH > 6).

CONSEILS DE SEMIS

- Profondeur de semis : 1 à 2 cm
- Dose de semis : 20 kg/ha
- Période de semis : juillet à septembre
- Conseils :
    - Semer sur un lit de semences bien tassé et fin en profondeur, mais émietté en surface et rappuyer au rouleau. La semence doit être au contact du sol, afin de développer au mieux son potentiel de germination. Semer sur un sol nivelé
    - Semer tôt pour avoir une production de biomasse élevée
    - Bien enfouir les semences pour qu’elles germent et ne risquent pas de se dessécher par le passage d’un rouleau
    - Semer à la volée ou au semoir

Moutarde blanche biologique à floraison jaune - Résistante aux NEMATODES

La moutarde blanche nematicide FOX réduit efficacement les populations de nematodes heterodera schachtii et heterodera betae actifs sur betterave sucrière. La moutarde FOX s'implante très rapidement, c'est une variété à floraison tardive ce qui lui permet d'être active sur une longue période.

Floraison fin novembre - Destruction : Gel -5° ou action mécanique.

La moutarde biologique est un **couvert d'été standard de type CIPAN** qui **conserve et améliore la fertilitté du sol et augmente le rendement de la culture suivante**.

Cette culture dérobée biologique a pour principale caractéristique d'**absorber l'azote restant dans le sol après une culture principale**.

La culture de moutarde biologique est gélive, elle ne résiste pas à l'hiver, elle est donc **conseillé pour les inter-cultures d'été.**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Plante d'engrais vert très massive et robuste pour la culture intercalaire.
Les racines très ramifiées laissent un sol finement grumeleux.

VARIANTES

La description	Choisissez votre conditionnement
	sac de 25kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Densité	20 kg/ha
Date de semis	De juillet à septembre
N° Partner&Co	320200030